



**Monitoring der Verbreitung:  
Wo und wie überleben die Vögel?**

Wenn die Jungvögel ihre ersten Kreise ziehen, verschwinden sie rasch aus dem Blickfeld der Beobachter. Die meisten bleiben die erste Zeit in der Nähe des Aussetzungsortes und ernähren sich vom ausgelegten Aas. Gegen den Herbst hin werden bei allen die Flugdistanzen weiter und die Betreuer stellen sich die bange Frage nach dem Schicksal der Junggeier. Haben sie die kritische Phase nach dem Ausfliegen heil überstanden? Wo halten sie sich jetzt auf? Bald einmal treffen bei den Meldestellen Beobachtungen ein:



Bartgeier Margunet, freigelassen am 5. Juni 1991 im Schweizerischen Nationalpark, ist am 7. Juli am Parpaner Rothorn bei Lenzerheide (GR, CH) gesichtet worden.

**151, 152** Nach dem Ausfliegen wird noch etwa zwei Monate lang Futter für die jungen Bartgeier ausgelegt.

**151, 152** De la nourriture est apportée aux jeunes durant deux mois environ après l'envol.

**151, 152** Dopo l'involo si depona il cibo per i giovani gipeti ancora per circa due mesi.

**151, 152** Suentar ch'ils tschess barbets giuvens han bandunà il gnieu vegn anc offert ad els pavel durant circa dus mais.

**151, 152** Once fledged, food continues to be put out for the young bearded vultures for about two months.